(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　L−ADVP　療法　1サイクル＿＿＿週

疾患名　急性リンパ性白血病(難反応例)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	①200 ml	点滴	キープ	①	①	①					②							①	①	①	③	③	③	③	①	③	③	③	③	③	③
			② 50 ml																													
			③100 ml																													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	(●)												●	(●)	(●)										
注射	3	ドキソルビシン	20 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●	●	(●)												※(●)	(●)	(●)										
		生理食塩液	100 ml																													
		※day15はオンコビンの後に投与																														
注射	4	オンコビン	※※1.4 mg/㎡	点滴(側管)	30分																											
		生理食塩液	100 ml			●							●							●							●						
			※※最大2mg																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ															●							●						
注射	6	ロイナーゼ	4000 K.U./㎡	点滴(側管)	4時間															※※※							※※※						
		注射用水	5000K.U./2mlで溶解																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		生理食塩液	500 ml																	●							●						
		※※※オンコビンの3時間後より開始																														
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																											
						●	●	●					●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	プレドニゾロン	40 mg/㎡	1日1(−2)回朝(昼)食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																															
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

【ロイナーゼ皮内反応の実施方法】
各サイクル初回とロットが違う場合実施

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					