(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　JALSG ALL-202 寛解導入　療法　1サイクル＿＿日

疾患名　Ph染色体陽性急性リンパ性白血病（60～64歳）

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	①200 ml	点滴	キープ	①	①	①					②							②							②						
			② 50 ml																														
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●																									
注射	3	ダウノマイシン	30 mg/㎡	点滴(側管)	1時間	●	●	●																									
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	オンコビン	※1.3 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●							●							●							●						
		生理食塩液	100 ml																														
			※最大2mg																														
注射	5	エンドキサン	800 mg/㎡	点滴(側管)	3時間	●																											
		生理食塩液	500 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ		●	●					●							●							●						
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	グリベック※	600 mg	1日1回食後									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	プレドニゾロン	60 mg/㎡	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●	●	●	●	●																					
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※グリベックDay8～63投与（8週間）
JALSG ALL-97 髄注（DEXA+MTX+Ara-C）療法併用

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					