(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　JALSG ALL-202地固め1(C1)　療法　1サイクル＿＿日

疾患名　Ph染色体陽性急性リンパ性白血病(15～59歳)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ				●	●																							
				①	1:30																												
注射	2	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ		●	●	●																								
				①																													
注射	3	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分																												
				①	9:30(day2)		●	●	●																									
					10:00(day3,4)																													
注射	4	メソトレキセート	100 mg/㎡	点滴(側管)	1時間																												
		5%糖液	50 ml	全量50mlに調製	10:00		●																										
				①																													
注射	5	メソトレキセート	900 mg/㎡	点滴(側管)	23時間																												
		5%糖液	500 ml	全量500mlに調製	11:00		●																										
				①																													
注射	6	シタラビン	2000 mg/㎡	点滴(側管)	3時間																												
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製	12時間毎			●	●																								
				①	10:30																												
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																												
				①	13:30			●	●																								
注射	8	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分																												
				①	22:00			●	●																								
注射	9	シタラビン	2000 mg/㎡	点滴(側管)	3時間																												
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製	12時間毎			●	●																								
				①	22:30																												
注射	10	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																							
		7%メイロン	20 ml	②	2:00																												
注射	11	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)					●	●																							
				②	4:00																												
注射	12	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																							
		7%メイロン	20 ml	②	6:00																												
注射	13	ソル・メルコート	50 mg	点滴(側管)	10分		●	●	●																								
		生理食塩液	50 ml	②	9:00																												
注射	14	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																							
		7%メイロン	20 ml	②	10:00																												
注射	15	ダイアモックス	250 mg	静注(側管)			●	●	●	●																							
		生理食塩液	20 ml	②	10:00																												
注射	16	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)					●	●																							
				②	10:00																												
注射	17	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																							
		7%メイロン	20 ml	②	14:00																												
注射	18	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)					●	●																							
				②	16:00																												
注射	19	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●																								
		7%メイロン	20 ml	②	18:00																												
注射	20	ソル・メルコート	50 mg	点滴(側管)	10分		●	●	●																								
		生理食塩液	50 ml	②	21:00																												
注射	21	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間	●	●	●	●																								
		7%メイロン	20 ml	②	22:00																												
注射	22	ダイアモックス	250 mg	静注(側管)		●	●	●	●																								
		生理食塩液	20 ml	②	22:00																												
注射	23	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)				●	●																								
				②	22:00																												

特記事項

・寛解後療法
・C1とC2(地固め療法2)を1サイクルとして4サイクル施行
・JALSG ALL-202 髄注療法併用

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					