(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　JALSG ALL-202 維持(スプリセル)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　Ph染色体陽性急性リンパ性白血病(寛解到達日より2～3年間)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	キープ	●																											
注射	2	オンコビン	※1.3 mg/m²	点滴(側管)	30分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
			※最大2mg																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	スプリセル	140 mg	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	プレドニゾロン	60 mg/m²	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●	●	●																							
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					