療法

1サイクル \_\_4 \_\_週

## 骨髓異形成症候群 疾患名

注射			用量(/回)	投与ルート	投与時間	1						2	П			П	3						4			Т		П
内服	Ro	商品名	用量(/日)	用法	ניון ניין ל אנ	1	2	3	4	5	6 7		10	11 1	2 13			16 17	7 12	8 10	9 20	21		23	24 2	5 26	3 27	28
放射線	ľ	照射部位	照射量	71372	•	Ė	H		Ť		1	Ť		1						-	-					1	-	-
		グラニセトロン	3 mg	点滴	30分		Н		$\dashv$			H	H			Н					+		$\dashv$		+	+	+	Н
注		デキサート	6.6 mg	W VIDI	0073	-																						
注射	1	7 7 7 1	0.0 mg			•																						
ניג						-																						
		ビダーザ	75 mg/ <b>m</b> ²	皮下注					-	+		-	Н			Н							$\dashv$		+	+	-	Н
:+		注射田北		及下压																								
注射	2	注射用水	25mg/mlで溶解			•		•				•																
别						-																						
							Н		_			-	Н			Н			-		+		$\dashv$		+	+	+-	$\perp$
						-																						
注射	3																											
射						_																						
													Ш			Ш									$\perp$	L	igspace	
																										1		
注射	4												Ш															
射	١																									1		
							Ц		Щ				Ц			Ш							Ш		$\perp$	4	$\perp$	Ц
注射	5																									1		
射	١																											
																П												
注射																												
射	6																											
							П						H			П										Т		H
注																												
注射	7					-																						
73.3																												
							H		$\dashv$			$\vdash$	H			Н			H			H	$\dashv$		$\pm$	+	+	Н
注						-																						
注射	8					-																						
ניג						-																						
										+		-	Н			Н							$\dashv$		+	+	-	Н
·+						-																						
注射	9					-																						
别																												
							Н		$\sqcup$		$\perp$		Н			Н		$\perp$			-		Ц		4	4	4	
注射	10																											
射																												
							Ц		Щ				Ц			Ш					1		Ц		$\perp$	4	$\perp$	Ц
内服		1					Ц		Щ	4			Ц			Щ									$\perp$	4	$\perp$	Ш
内服							Ц		Ш				Ц			Ш							Ц		$\perp$	4		Ш
内服							Ц		Ш				Ц			Ш							Ц		$\perp$	4		Ц
内服							Ш						Ц			Ш										4		Ш
内服													Ш			Ш												Ш
内服	_						$\bigsqcup$						Ш			Ш												ot
内服																												
内服	8												П			П							П			Т		П
内服	9												П			П							П			T		П
内服							П					T	П			П							П			Т		П
放射線			Gy				П					Ĺ	П			П							П			$\top$		П
		1			特記事項							-					_	-	- 1		-							$\dashv$
• 目 •		金曜日に投与(休日をはさみ4日と	2日に公かれる†	무슨차(1)																								$\overline{}$

・月〜金曜日に投与(休日をはさみ4日と3日に分かれる場合あり) ・末梢ルートの確保が困難な症例では、皮下投与へ変更可能

・適宜デカドロンの内服を追加する

薬品名	ビダーザ											
標準投与量	75 mg∕ <b>m</b> i̇́											
1段階減量	37.5 mg∕ <b>m</b> ²											
2段階減量	25 mg∕ <b>m</b> ²											
3段階減量	中止											