(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　キロサイド持続点滴(AML)　療法　1サイクル 2 週

疾患名　骨髄異形成症候群(1～10サイクル)

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●	●	●	●	●																					
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●	●	●	●																					
注射	3	キロサイド 生理食塩液	100 mg/㎡ 500 ml	点滴(側管)	24時間	●	●	●	●	●	●	●																					
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ								●																				
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

・制吐剤は適宜使用
・休薬期間は原則1週間以上あける
・休薬期間は患者の状態により変わるため、2サイクル目以降継続投与の場合あり→問い合わせ必要

減量規定

薬品名	キロサイド(65～79歳)		キロサイド(80歳以上)				
標準投与量		100mg/㎡		100mg/㎡			
1段階減量	PS0～3	1～2/3量	PS0～3	2/3～1/2量			
2段階減量	PS4	2/3～1/2量	PS4	1/2～1/3量			
3段階減量							