

# 治療計画書

療法名

R-B(ベンダムスチン)

療法

1サイクル

4 週

(ID 0 ) ☆7

疾患名 再発又は難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マントル細胞リンパ腫

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																											
			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●																								
注射	2	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	フローシードに従う																											
		生理食塩液	ml	10倍希釈		●																										
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																											
						●																										
注射	4	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分																											
		デキサート	6.6 mg			●	●																									
注射	5	トリアキシン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	1時間																											
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製		●	●																									
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	クロルフェニラミン	6 mg		リツキシマブ投与30分前	●																										
内服	2	イブuproフェン	200 mg		リツキシマブ投与30分前	●																										
内服	3	デカドロン	8 mg		1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●																						
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

・副作用により減量を行った場合、以降投与量を維持し増量しない  
 ・リツキシマブの最大投与回数8回

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量