(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　R-C(クラドリビン)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　難治性・再発、低悪性度非ホジキンリンパ腫(5サイクル)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4					
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●	●	●	●																					
注射	2	リツキシマブ	375 mg/㎡	点滴(側管)	フローシートに従う																											
		生理食塩液	ml	10倍希釈		●																										
注射	3	ロイスタチン	0.09 mg/kg	点滴(側管)	2時間																											
		生理食塩液	250 ml				●	●	●	●	●																					
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●	●	●	●	●	●																					
注射	5																															
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	ネオマレルミンTR	6 mg	リツキシマブ投与30分前		●																										
内服	2	ブルフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前		●																										
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

・リツキシマブの最大投与回数8回

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					