

治療計画書

療法名

R-DeVIC

療法

1サイクル 週

疾患名 非ホジキンリンパ腫

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																															
			用量(/日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
		照射部位	照射量																																	
注射	1	生理食塩液	①200 ml ②500 ml	点滴	キープ	①	②	②	②																											
注射	2	生理食塩液	200 ml	点滴(側管)	キープ	●	●	●																												
注射	3	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴(側管)	フローシートに従う	●																														
注射	3	生理食塩液	ml	10倍希釈																																
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●																														
注射	5	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●																												
注射	5			ケモセーフ側管②																																
注射	6	デキサート	33 mg	点滴(側管)	15分	●	●	●																												
注射	6	生理食塩液	50 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	7	カルボプラチン	300 mg/m ²	点滴(側管)	1時間	●																														
注射	7	5%糖液	250 ml	ケモセーフ側管①																																
注射	8	ラステット	100 mg/m ²	点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
注射	8	生理食塩液	500 ml	ケモセーフ側管①																																
注射	9	ウロミテキサン	300 mg/m ²	点滴(側管)	30分	●	●	●																												
注射	9	生理食塩液	50 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	9	※イホマイド前																																		
注射	10	イホマイド	1500 mg/m ²	点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
注射	10	生理食塩液	500 ml	ケモセーフ側管①																																
注射	11	7%メイロン	20 ml	点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
注射	11	生理食塩液	500 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	11	※イホマイド終了時より開始																																		
注射	12	ウロミテキサン	300 mg/m ²	点滴(側管)	30分	●	●	●																												
注射	12	生理食塩液	50 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	12	※イホマイド開始から4時間後																																		
注射	13	7%メイロン	20 ml	点滴(側管)	3時間30分	●	●	●																												
注射	13	生理食塩液	500 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	14	ウロミテキサン	300 mg/m ²	点滴(側管)	30分	●	●	●																												
注射	14	生理食塩液	50 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	14	※イホマイド開始から8時間後																																		
注射	15	7%メイロン	20 ml	点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
注射	15	生理食塩液	500 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	16	7%メイロン	20 ml	点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
注射	16	生理食塩液	500 ml	ケモセーフ側管②																																
注射	17	フィルグラスチム	50 µg/m ²	皮下注		Day5～適宜使用																														
内服	1	ネオマレルミンTR	6 mg	リツキシマブ投与30分前		●																														
内服	2	ブルフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前		●																														
内服	3																																			
内服	4																																			

特記事項

・リツキシマブの最大投与回数8回