(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　R-GPD　療法　1サイクル 4 週

疾患名　再発・難治性非ホジキンリンパ腫（3～6サイクル）

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間		1							2							3							4					
内服	Rp		用量(/日)	用法			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●							●																		
注射	2	リツキシマブ	375 mg/㎡	点滴(側管)	フローシートに従う																											
		生理食塩液	ml	10倍希釈		●																										
注射	3	ソリューゲンF	500 ml	点滴(側管)	2時間		●																									
注射	4	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分		●																									
注射	5	デキサート	6.6 mg	点滴(側管)	30分									●																		
		生理食塩液	100 ml																													
注射	6	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴(側管)	30分		●							●																		
		生理食塩液	100 ml																													
注射	7	生理食塩液	500 ml	点滴(側管)	2時間		●																									
注射	8	シスプラチン	75 mg/㎡	点滴(側管)	2時間		●																									
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																												
注射	9	ソリューゲンF	500 ml	点滴(側管)	2時間		●																									
注射	10	ソリューゲンF	500 ml	点滴(側管)	2時間		●																									
注射	11	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●								●																		
内服	1	ネオマレルミンTR	6 mg	リツキシマブ投与30分前		●																										
内服	2	ブルフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前		●																										
内服	3	デカドロン	40 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●	●																						
内服	4	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前			●																									
内服	5	イメンド	80 mg	1日1回朝食後				●	●																							
内服	6																															
放射線			Gy																													

特記事項

・ラシックス注は適宜使用
・リツキシマブの最大投与回数8回

減量規定

薬品名	ゲムシタビン	シスプラチン			
標準投与量	1000 mg/㎡	75 mg/㎡			
1段階減量	500 mg/㎡	37.5 mg/㎡			
2段階減量	中止	中止			
3段階減量					