(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　R-VEMP　療法　1サイクル 1 週

疾患名　非ホジキンリンパ腫（10サイクル）

	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4					
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	①200 ml	点滴	キープ	①	②					①	②						①	②						①	②					
		生理食塩液	② 50 ml																													
注射	2	リツキシマブ	375 mg/m²	点滴(側管)	フローシートに従う																											
		生理食塩液	ml	10倍希釈		●						●							●							●						
注射	3	オンコビン	1 mg	点滴(側管)	30分																											
		生理食塩液	100 ml				●						●							●							●					
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																											
						●	●					●	●						●	●						●	●					
注射	5																															
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
注射	10																															
内服	1	ネオマレルミンTR	6 mg	リツキシマブ投与30分前		●						●							●							●						
内服	2	ブルフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前		●						●							●							●						
内服	3	エンドキサン	1 mg/kg	1日1回朝食後			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	4	ロイケリン	1 mg/kg	1日1回朝食後			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	5	プレドニゾロン	0.6-0.8 mg/kg	1日3回毎食後			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	6																															
放射線			Gy																													

特記事項

・リツキシマブの最大投与回数8回

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					