

治療計画書

療法名 Pol-R-B(ベンダムスチン) 2-6コース目

療法 1サイクル 3 週

疾患名 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(6サイクル)

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回) 用量(/日)	投与ルート 用法	投与時間																													
		照射部位	照射量																															
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●●																												
注射	2	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	フローシードに従う	●																												
		生理食塩液	ml	10倍希釈																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	30分	●																												
注射	4	ポライビー	1.8 mg/kg	点滴(側管)	90分	●																												
		注射用水	20mg/mLで溶解				初回忍容性あれば																											
		生理食塩液	0.72-2.7mg/mLで希釈				30分可																											
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	10分	●																												
注射	6	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●●																												
		デキサート	6.6 mg																															
注射	7	トレアキシン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	1時間	●●																												
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製																														
注射	8																																	
注射	9																																	
注射	10																																	
内服	1	クロルフェニラミン	6 mg	リツキシマブ投与30分前		●																												
内服	2	イブプロフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前		●																												
内服	3	デカドロン	8 mg			●●●																												
内服	4																																	
内服	5																																	
内服	6																																	
内服	7																																	
内服	8																																	
内服	9																																	
内服	10																																	
放射線			Gy																															

特記事項

- 副作用により減量を行った場合、以降投与量を維持し増量しない
- リツキシマブの最大投与回数8回
- ポライビー:0.2又は0.22µmのインラインフィルターを使用して投与

減量規定

薬品名	ベンダムスチン	ポライビー				
標準投与量	90 mg/m <sup>2</sup>	1.8 mg/kg				
1段階減量	70 mg/m <sup>2</sup>	1.4 mg/kg				
2段階減量	50 mg/m <sup>2</sup>	中止				
3段階減量	中止					