(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ベンダムスチン　療法　1サイクル 3 週

疾患名　再発又は難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マントル細胞リンパ腫

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1						2							3						4					
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																												
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●																								
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●																								
		デキサート	6.6 mg																												
注射	3	トレアキシン	120 mg/㎡	点滴(側管)	1時間	●	●																								
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製																											
注射	4																														
注射	5																														
注射	6																														
注射	7																														
注射	8																														
注射	9																														
注射	10																														
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後				●	●	(●)																					
内服	2																														
内服	3																														
内服	4																														
内服	5																														
内服	6																														
内服	7																														
内服	8																														
内服	9																														
内服	10																														
放射線			Gy																												

特記事項

副作用により減量を行った場合、以降投与量を維持し増量しない

減量規定

薬品名	トレアキシン				
標準投与量	120 mg/㎡				
1段階減量	90 mg/㎡				
2段階減量	60 mg/㎡				
3段階減量					