

治療計画書

療法名

DeVIC

療法

1サイクル

週

疾患名 非ホジキンリンパ腫

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(回)		投与ルート	投与時間																															
			用量(回)	用量(日)			用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	8		
		照射部位	照射量																																		
注射	1	生理食塩液	500 ml		点滴	キープ	●	●	●																												
注射	2	生理食塩液	200 ml		点滴(側管)	キープ	●	●	●																												
					ケモセーフメイン																																
注射	3	グラニセトン	3 mg		点滴(側管)	30分	●	●	●																												
					ケモセーフ側管②																																
注射	4	デキサート	33 mg		点滴(側管)	15分	●	●	●																												
		生理食塩液	50 ml		ケモセーフ側管②																																
注射	5	カルボプラチン	300 mg/m ²		点滴(側管)	1時間	●																														
		5%糖液	250 ml		ケモセーフ側管①																																
注射	6	ラステット	100 mg/m ²		点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
		生理食塩液	500 ml		ケモセーフ側管①																																
注射	7	ウロミテキサン	300 mg/m ²		点滴(側管)	30分	●	●	●																												
		生理食塩液	50 ml		ケモセーフ側管②																																
		※イホמיד前																																			
注射	8	イホמיד	1500 mg/m ²		点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
		生理食塩液	500 ml		ケモセーフ側管①																																
注射	9	7%メイロン	20 ml		点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
		生理食塩液	500 ml		ケモセーフ側管②																																
		※イホמיד終了時より開始																																			
注射	10	ウロミテキサン	300 mg/m ²		点滴(側管)	30分	●	●	●																												
		生理食塩液	50 ml		ケモセーフ側管②																																
		※イホמיד開始から4時間後																																			
注射	11	7%メイロン	20 ml		点滴(側管)	3時間30分	●	●	●																												
		生理食塩液	500 ml		ケモセーフ側管②																																
注射	12	ウロミテキサン	300 mg/m ²		点滴(側管)	30分	●	●	●																												
		生理食塩液	50 ml		ケモセーフ側管②																																
		※イホמיד開始から8時間後																																			
注射	13	7%メイロン	20 ml		点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
		生理食塩液	500 ml		ケモセーフ側管②																																
注射	14	7%メイロン	20 ml		点滴(側管)	2時間	●	●	●																												
		生理食塩液	500 ml		ケモセーフ側管②																																
注射	15	フィルグラスチム	50 μg/m ²		皮下注		Day5～適宜使用																														
注射	16																																				
内服	1																																				
内服	2																																				
内服	3																																				
内服	4																																				
特記事項																																					
減量規定																																					
薬品名																																					
標準投与量																																					
1段階減量																																					
2段階減量																																					
3段階減量																																					