(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　EPOCH　療法　1サイクル 3～4 週

疾患名　非ホジキンリンパ腫

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●	●		●																					
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●		●																					
注射	3	オンコビン	0.4 mg/㎡	点滴(側管)	24時間	●	●	●	●																							
		ラステット	50 mg/㎡																													
		ドキソルビシン	10 mg/㎡																													
		生理食塩液	500 ml																													
注射	4	エンドキサン	750 mg/㎡	点滴(側管)	2時間																											
		生理食塩液	500 ml								●																					
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ					●																						
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	プレドニゾロン	60 mg/㎡	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●	●	●	●																					
内服	2	ナウゼリン	30 mg	1日3回毎食前		(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)																					
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					