(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　G-CHOP（1サイクル目）　療法　1サイクル 3 週

疾患名　CD20陽性の濾胞性リンパ腫（8サイクル）

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1						2						3						4					
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
放射線		照射部位	照射量																												
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●					●							●												
注射	2	プレドニン	100 mg	点滴(側管)	30分	●																									
		生理食塩液	50 ml																												
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	30分	●																									
注射	4	ガザイバ	1000 mg/body	点滴(側管)	フローシートに従う	●						●							●												
		生理食塩液	210 ml	全量250mlに調製																											
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●						●							●												
注射	6	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分		●																								
注射	7	ドキソルビシン	50 mg/㎡	点滴(側管)	30分		●																								
		生理食塩液	100 ml																												
注射	8	オンコビン	※1.4 mg/㎡	点滴(側管)	30分		●																								
		生理食塩液	100 ml																												
			※最大2mg																												
注射	9	エンドキサン	750 mg/㎡	点滴(側管)	2時間		●																								
		生理食塩液	500 ml																												
注射	10																														
内服	1	ネオマレルミンTR	6 mg	ガザイバ投与30分前		●						●							●												
内服	2	カロナール	1000 mg	ガザイバ投与30分前		●						●							●												
内服	3	プレドニゾロン	100 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●	●																				
内服	4																														
内服	5																														
内服	6																														
内服	7																														
内服	8																														
内服	9																														
内服	10																														
放射線			Gy																												

特記事項

ガザイバ：0．2又は0．22μ mのインラインフィルターを使用すること。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					