(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　C-MOPP+ABVD（ABVDコース）　療法　1サイクル 4 週

疾患名　ホジキンリンパ腫（※5サイクル）

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●														●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●														●													
注射	3	ドキソルビシン	25 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●														●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	ブレオ	※9 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●														●													
		生理食塩液	100 ml																														
			※最大15mg																														
注射	5	エクザール	6 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●														●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	6	ダカルバジン	250 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●														●													
		注射用水	10mg/mlで溶解																														
		生理食塩液	500 ml																														
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●														●													
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※C-MOPPとABVDを交互に5回繰り返す
制吐療法のステロイドは適宜使用

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					