(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　A＋AVD　療法　1サイクル 4 週

疾患名　未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫（最大6サイクル）

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	500 ml	点滴	キープ	●														●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	ドキソルビシン	25 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●														●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	エクザール	※6 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●														●													
		生理食塩液	100 ml																														
			※最大10mg																														
注射	5	ダカルバジン	375 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●														●													
		注射用水	10mg/mlで溶解																														
		生理食塩液	500 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	10分	●														●													
注射	7	アドセトリス	※1.2 mg/kg	点滴(側管)	30分	●														●													
		注射用水	5mg/mlで溶解																														
		生理食塩液	※0.4-1.2mg/mlで希釈																														
			※最大120mg																														
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	15分	●														●													
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	朝食後			●	●													●	●											
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※アドセトリスが50mg以下の場合は生理食塩液50mlで、50-150mgの場合は生理食塩液100mlで、150mg以上の場合は250mlで希釈する。
アドセトリス：CCr30未満で減量を考慮

減量規定

薬品名	アドセトリス				
標準投与量	1.2 mg/kg				
1段階減量	0.9 mg/kg				
2段階減量	中止				
3段階減量					