(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ベルケイド皮下注　療法　1サイクル 3 週

疾患名　再発又は難治性の多発性骨髄腫(8サイクル)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	ベルケイド	1.3 mg/㎡	皮下注		●			●				●			●																
		生理食塩液	2.5mg/mlで溶解																													
注射	2																															
注射	3																															
注射	4																															
注射	5																															
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	レナデックス	20 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●		●	●			●	●		●	●															
内服	2																															
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

末梢神経障害で休薬後、症状が回復した場合はベルケイドを0.7mg/m^{2}に減量し、週1回投与に変更する

減量規定

薬品名	ベルケイド				
標準投与量	1.3 mg/㎡				
1段階減量	1.0 mg/㎡				
2段階減量	0.7 mg/㎡				
3段階減量	中止				