(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　CP大量間欠　療法　1サイクル 1 週

疾患名　多発性骨髄腫

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1							2							3							4						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	100 ml	点滴	キープ	●																											
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●																											
注射	3	エンドキサン 生理食塩液	250 mg/㎡ 500 ml	点滴(側管)	2時間	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	プレドニゾロン	100 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●		●		●		●																					
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					