療法

1サイクル_3 週

再発又は難治性の多発性骨髄腫(1-8サイクル) 疾患名

N #1				4n. i	±0. ← 5± 00							_	_	_	_			_				_	-		, ,	_		1			
注射		商品名	用量(/回)	投与ルート 用法	投与時间	1	2 3		_		- 2	2					3	3					4					_			
	Кp	照射部位	用量(/日) 照射量	用法		1	2 3	3 4	5	6	7 8	8 9	9 10	0 11	12	13	14 1	5 16	6 17	18	19	20 2	21 2:	2 23	3 24	25 2	26 27	28			
放射線		照別部位	照別里 1.3 mg/m ²	皮下注						Н					Н							+									
:+		ベルケイド 生理食塩液	1.3 mg/III 2.5mg/mlで溶解	及下注																											
注射	1	上 理 艮 塩 枚	Z.5mg/mi C/谷胖			•		•																							
別																															
										Н		+			Н					-		+			Н						
:+																															
注射	2					- 1																									
別																															
										Н					Н							+									
:+																															
注射	3																														
ויל																															
								-		Н	-	+		+	Н		-	+		\vdash		+			Н			H			
注																															
注射	4																														
3,1																															
										\vdash	+	+			Н		+			\vdash		+	+		Н			\dashv			
:+						-																									
注射	5																														
ניג						-																									
								_		Н	-	+		-	Н					H		+			Н			H			
:+																															
注射	6																														
ויל																															
								-		Н	-	+		-	Н		-	+		\vdash		+			Н			H			
注						-																									
注射	7																														
ניג																															
								-		H		+			Н			+		┢		+			H			H			
注																															
注射	8																														
20																															
								_		H		+			Н					\vdash		+			Н			H			
注																															
注射	9																														
711																															
										H		+			Н		-			H		+			H			\forall			
注																															
注射	10																														
711																															
内服	1	ファリーダック	20 mg	1日1回	<u> </u>	•			•	H			•		•		\pm					+	\dagger		H			\Box			
内服	2	レナデックス	20 mg	1日1(-2)回朝		•		•						•	•					H		+			H			\forall			
内服	3					Ē		Ť	Ť	H	Ť	Ť		Ť	Ħ					H		+			H			Ħ			
内服										Ħ		T		T	П					T		7			П			\Box			
内服										Ħ	\dagger	T		T	П					T		+			П						
内服	6									H		1			П		\top		T	T	Ħ	1	1		Н			\forall			
内服	7									H		1			П		\top		T	T	Ħ	1	1		Н			\forall			
内服										H					П		\top		Т	T		+	1		Н			\forall			
内服										H		1			П		\top		T	T	Ħ	1	1		Н			\forall			
放射線			Gy							H					П		\top		Т	T		+	1		Н						
					特記事項							_							-									-			
1 144																															

末梢神経障害で休薬後、症状が回復した場合はベルケイドを0.7mg/m2に減量し、週1回投与に変更する ファリーダックはQT>500msecで中止。QT 480~500msecまたはベースラインから60msecを超える延長で休薬し、7日以内に回復した場合は同用量で再開する。再発した場合は休薬し、7日以内に回復した場合は休薬前の投与量から1回5mg減量する。7日以内に回復しない場合はファリーダック中止。

※詳細は適正使用ガイド参照

減量規定													
薬品名	ベルケイド	ファリーダック											
標準投与量	1.3 mg/ m ²	20 mg											
1段階減量	1.0 mg/ m ²	15 mg											
2段階減量	0.7 mg/ m ²	10 mg											
3段階減量	中止	中止											