(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　VRd(皮下注)　療法　1サイクル 3 週

疾患名　多発性骨髄腫

		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	ベルケイド	1.3 mg/㎡	皮下注		●			●				●			●																	
		生理食塩液	2.5mg/mlで溶解																														
注射	2																																
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レブラミド	25 mg	1日1回就寝前		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	レナデックス	20 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●		●	●			●	●		●	●																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

減量規定

薬品名	ベルケイド	レブラミド			
標準投与量	1.3 mg/㎡	25 mg/day			
1段階減量	1.0 mg/㎡	20 mg/day			
2段階減量	0.7 mg/㎡	15 mg/day			
3段階減量	中止	10 mg/day			
4段階減量		5 mg/day			
5段階減量		中止			