

治療計画書

療法名

IsaPd

療法

1サイクル

4 週

疾患名 **再発又は難治性の多発性骨髄腫(1サイクル目)**

注射 内服 放射線	Rp 商品名 照射部位	用量(/回) 用量(/日) 照射量	投与ルート 用法	投与時間	1						2						3							4					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
注射	生理食塩液	250 ml	点滴	キープ	●						●						●							●					
注射	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	キープ	●						●						●							●					
注射	サークリサ	10 mg/kg	点滴(側管)	フローシートに従う	●						●						●							●					
	生理食塩液	250 ml	全量250mLに調製		●						●						●							●					
注射	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●						●						●							●					
注射																													
注射																													
注射																													
注射																													
注射																													
注射																													
注射																													
注射																													
内服	1 レナデックス	40 mg	サークリサ投与15-60分前		●							●					●							●					
内服	2 クロルフェニラミン	6 mg	サークリサ投与15-60分前		●							●					●							●					
内服	3 カロナール	1000 mg	サークリサ投与15-60分前		●							●					●							●					
内服	4 ポマリスト	4 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
内服	5 ファモチジン	20 mg	サークリサ投与15-60分前		●							●						●						●					
内服	6																												
内服	7																												
放射線		Gy																											

特記事項

- ・インフュージョンリアクションGrade2出現時は、Grade1以下まで回復後に87.5mg/時で投与を再開できる。Grade 3以上のインフュージョンリアクションが出現した場合は、投与を中止する。
- ・75歳以上の患者には、レナデックスを20mg/週で投与してもよい。

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量