(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　IsaPd　療法　1サイクル 4 週

疾患名　再発又は難治性の多発性骨髄腫(2サイクル目以降)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	250 ml	点滴	キープ	●														●													
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	キープ	●														●													
注射	3	サークリサ	10 mg/kg	点滴(側管)	フローシートに従う	●														●													
		生理食塩液	250 ml	全量250mLに調製																													
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●														●													
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レナデックス	40 mg	サークリサ投与15-60分前		●														●													
内服	2	レナデックス	40 mg	1日1回									●														●						
内服	3	クロルフェニラミン	6 mg	サークリサ投与15-60分前		●														●													
内服	4	カロナール	1000 mg	サークリサ投与15-60分前		●														●													
内服	5	ポマリスト	4 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
内服	6	ファモチジン	20 mg	サークリサ投与15-60分前		●														●													
内服	7																																
放射線			Gy																														

特記事項

・インフュージョンリアクションGrade2出現時は、Grade1以下まで回復後に87.5mg/時で投与を再開できる。Grade 3以上のインフュージョンリアクションが出現した場合は、投与を中止する。
・75歳以上の患者には、レナデックスを20mg/週で投与してもよい。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					