(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　サイラムザ　療法　1サイクル 2 週

疾患名　がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng／mL以上の切除不能な肝細胞癌

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	5分	●														●													
注射	2	サイラムザ	8 mg/kg	点滴	1時間	●														●													
		生理食塩液	250 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	5分	●														●													
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	抗がん剤投与30分前		●														●													
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※G1または2のinfusion reactionが発現した場合は2時間になるよう減速し、その後の投与においても減速した速度で投与する。
(infusion reactionが発現した場合の対応については添付文書参照)

減量規定

薬品名	サイラムザ				
標準投与量	8 mg/kg				
1段階減量	6 mg/kg				
2段階減量	5 mg/kg				
3段階減量	中止				