(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　カペシタビン+アバスチン　療法　1サイクル 3 週

疾患名　治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	2	アバスチン	7.5 mg/kg	点滴	※初回90分	●																											
		生理食塩液	100 ml		2回目60分可																												
					3回目以降																												
					30分可																												
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
内服	1	ゼローダ※※	2000 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																

特記事項

※アバスチンは初回90分で投与、忍容性が良ければ2回目以降60分、3回目以降30分で投与可。
※※ゼローダは1日目の夕食後より服用開始

ゼローダ減量基準	1日投与量		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36㎡未満	2400mg/日	1800mg/日	1200mg/日
1.36㎡以上1.41㎡未満	3000mg/日		
1.41㎡以上1.51㎡未満		2400mg/日	
1.51㎡以上1.66㎡未満			1800mg/日
1.66㎡以上1.81㎡未満	3600mg/日		
1.81㎡以上1.96㎡未満		3000mg/日	
1.96㎡以上2.11㎡未満	4200mg/日		
2.11㎡以上			2400mg/日

減量規定

薬品名	アバスチン	ゼローダ			
標準投与量	7.5 mg/kg	上記参照			
1段階減量	減量なし				
2段階減量					
3段階減量		中止(CCr≦30)			