療法

## 疾患名 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

無理を	3.61		T		+π. ⊢ · · ·	+n ⊢ n+ n□		_					. —	_		_	_	1			-	_							$\overline{}$
押職化   一規形部位   一規形部位   一規形部位   一規形部位   一規形部位   一規形部位   一規形   一規形   一規形   一規形   一見   一見   一見   一見   一見   一見   一見   一	注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1				Н			-			L	3	Ш		4					Ш			Ц
注 対				用量(/日)	用法		1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11	12 1	3 14	1 15	16	17	18	19 2	0 2	1 22	23	24	25 2	6 27	28
注 対 2	放射線		照射部位		L	T **					Ш								Ш		_					Ш			
接触性			グラニセトロン		点滴	30分																							
注 対 2    注 理食塩液	注	1	デキサート	6.6 mg																									
注 対 2	射	ļ '					•																						
注 対 2																													
注対 3    注対 3   注			生理食塩液	50 ml	点滴	15分					П																		
注対 3    注対 3   注	注																												
注対 3    注対 3   注	射	2					•																						
注 対 3 生理食塩液 50 ml 点滴 15分																													
注 対 3 生理食塩液 50 ml 点滴 15分			アバスチン	7.5 mg/kg	点滴	※初回90分					Н								П		1					П			
対	注		生理食塩液		711.71-2																								
注対 4  注対 5  注対 7  注対 7  注対 8	射	3	<u></u>	100 1111		3回日以降	•																						
注 対	71																												
注 対 *			<b>上</b> 田 合 作 游	50 ml	占海			+			Н		+	$\vdash$		+	+		Н		$\dashv$	+		+		H			H
注対 5 5%糖液 250 ml 点滴 15分	注		工埕及塩水	30 1111	ボル	1371																							
注対 5 5%糖液 250 ml 点滴 15分	肚	4					lacktriangle																						
注射 5 5%糖液 250 ml 点滴 15分	ניג																												
注射 5 5%糖液 250 ml 点滴 15分			<b>-</b> 11 →=L	120 /m²	上海	の吐胆		_			Н		+				-	+-	Н		$\dashv$	_		-		$\vdash$			H
対	:+		エルノフット		<b>从</b> //	乙叶旧																							
注 接	注	5	5%糖液	250 mi			•																						
注射 7	别																												
注射 7			<b> </b>	F0 1	F >±	457		_			Н		-	_		4			Н		4	4		-		Н	4		Н
注対			<b>生埋</b> 良塩液	50 ml		1577																							
注対	注	6					•																						
注	射																												
注											Ш						_		Ш		4								Ш
注																													
注	汪	7																											
内服 1 ゼローダ※※ 2000 mg/m 1日2回朝夕食後   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	射																												
内服 1 ゼローダ※※ 2000 mg/m 1日2回朝夕食後   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●											Ш										4								
内服 1 ゼローダ※※ 2000 mg/m 1日2回朝夕食後   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●																													
内服 1 ゼローダ※※ 2000 mg/m 1日2回朝夕食後   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	注	8																											
内服 2 デカドロン 8 mg 1日1(-2)回朝(昼)食後   ● ●	射																												
内服 2 デカドロン 8 mg 1日1(-2)回朝(昼)食後   ● ●																													
内服         3         二、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四、四					1日2回朝:	夕食後	lacktriangle	•	•	•		•		•		•			Ш							Ш			Ш
内服       4			デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝	(昼)食後		•			Ш																		Ш
内服       5       二											Ш																		Ш
内服       6       1											Ш								Ш										Ш
内服     7       内服     8       内服     9       内服     10											Ш																		Ш
内服     8       内服     9       内服     10																					$oxed{I}$								ĹĴ
内服     9       内服     10																													
内服 10											П										T								
											П																		
	内服	10									П																		
						特記事項							-															•	_

エルプラット総投与量が600mg/㎡を超えた場合、エルプラットは担当医の判断で適宜休止して次のサイクルを開始する。 ※アバスチンは初回90分で投与、忍容性が良ければ、2回目以降60分、3回目以降30分で投与可。※※ゼローダは1日目の夕食後より服用開始

ゼロ一ダ減量基準	1日投与量								
プローダ     東泰学	初回投与量	減量段階1	減量段階2						
1.36㎡未満	2400mg/日	1800mg/日	1200mg/日						
1.36㎡以上1.41㎡未満		тооопіg/ Ц							
1.41㎡以上1.51㎡未満	3000mg/日								
1.51㎡以上1.66㎡未満		2400mg/日							
1.66㎡以上1.81㎡未満	3600mg/日		1800mg/日						
1.81㎡以上1.96㎡未満	3000mg/ 🗖		1800mg/ □						
1.96㎡以上2.11㎡未満	4200/□	3000mg/日							
2.11㎡以上	4200mg/日		2400mg/日						

減量規定												
薬品名	アバスチン	エルプラット	ゼローダ									
標準投与量	7.5 mg/kg	130 mg/ <b>m</b> ⁴										
1段階減量	減量なし	100 mg/ <b>m</b> ²	上記参照									
2段階減量		85 mg∕ <b>m</b> í	]									
3段階減量			中止(CCr≦30)									