(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　sLV-5FU2　療法　1サイクル 2 週

□ 結腸がんにおける術後化学療法(6ヶ月)

疾患名　□ 進行再発大腸がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ	●														●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴	2時間	●														●													
		生理食塩液	200 ml																														
注射	4	5-FU	400 mg/㎡	点滴	全開	●														●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	6	5-FU	2400 mg/㎡	持続注入用ポンプ	46時間	●	●	●												●	●	●											
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	7	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート				●														●											
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

3ヶ月(6コース)でmFOLFOX6療法に切り替えて6コースずつ交互に投与する場合あり。

減量規定

薬品名	レボホリナート	5-FU(急速)	5-FU(持続)		
標準投与量	200 mg/㎡	400 mg/㎡	2400 mg/㎡		
1段階減量	減量なし	300 mg/㎡	2000 mg/㎡		
2段階減量		200 mg/㎡	1600 mg/㎡		
3段階減量					