

治療計画書

療法名

sLV-5FU2+アバスチン

療法

1サイクル 2 週

疾患名 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

注射	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		内服	Ro	用量(/日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
放射線	照射部位	照射量																														
注射	1 生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ																												
注射	2 グラニセトロン デキサート	3 mg 6.6 mg	点滴	30分																												
注射	3 生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
注射	4 アバスチン 生理食塩液	※5 mg/kg 100 ml	点滴	※※初回90分 2回目60分可 3回目以降 30分可																												
注射	5 生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
注射	6 レボホリナート 生理食塩液	200 mg/m ² 200 ml	点滴	2時間																												
注射	7 5-FU 生理食塩液	400 mg/m ² 50 ml	点滴	全開																												
注射	8 生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
注射	9 5-FU 生理食塩液	2400 mg/m ² 100 ml	持続注入用ポンプ 全量100mlに調製	46時間																												
注射	10 ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート																													
内服	1																															
内服	2																															
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線		Gy																														

特記事項

※二次治療において、前治療からの変更理由が増悪による変更で、FOLFOX4+アバスチンを投与し、エルプラットの副作用によりsLV5FU2+アバスチンに変更する場合は、基準投与量が10mg/kgの場合あり。

※※アバスチンは初回90分で投与、忍容性が良ければ2回目以降60分、3回目以降30分で投与可。

減量規定

薬品名	アバスチン	レボホリナート	5-FU(急速)	5-FU(持続)	
標準投与量	5 mg/kg	200 mg/m ²	400 mg/m ²	2400 mg/m ²	
1段階減量	減量なし	減量なし	300 mg/m ²	2000 mg/m ²	
2段階減量			200 mg/m ²	1600 mg/m ²	
3段階減量					