

治療計画書

療法名

sLV-5FU2+ベクティビックス

(ID 0) ☆7

療法

1サイクル 2 週

疾患名 KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

注 射 内 服 放 射 線	Rp	商品名	用量(回)	投与ルート	投与時間																													
			用量(日)			用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																															
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ																													
注射	2	グラニセトロン デキサート	3 mg 6.6 mg	点滴	30分																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																													
注射	4	ベクティビックス 生理食塩液	6 mg/kg 100 ml	点滴	1時間																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																													
注射	6	レボホリナート 生理食塩液	200 mg/m ² 200 ml	点滴	2時間																													
注射	7	5-FU 生理食塩液	400 mg/m ² 50 ml	点滴	全開																													
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																													
注射	9	5-FU 生理食塩液	2400 mg/m ² 100 ml	持続注入用ポンプ	46時間																													
注射	10	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート																														
内服	1																																	
内服	2																																	
内服	3																																	
内服	4																																	
内服	5																																	
内服	6																																	
内服	7																																	
内服	8																																	
内服	9																																	
内服	10																																	
放射線		Gy																																
特記事項																																		
減量規定																																		
薬品名	ベクティビックス		レボホリナート		5-FU(急速)		5-FU(持続)																											
標準投与量	6 mg/kg		200 mg/m ²		400 mg/m ²		2400 mg/m ²																											
1段階減量	4.8 mg/kg		減量なし		300 mg/m ²		2000 mg/m ²																											
2段階減量	3.6 mg/kg				200 mg/m ²		1600 mg/m ²																											
3段階減量	中止																																	