(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　FOLFIRI+ベクティビックス　療法　1サイクル 2 週

疾患名　KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ	●														●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	4	ベクティビックス	6 mg/kg	点滴	1時間	●														●													
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	6	トポテシン	150 mg/㎡	点滴	2時間	●														●													
		生理食塩液	250 ml																														
注射	7	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●														●													
		生理食塩液	200 ml																														
注射	8	5－FU	400 mg/㎡	点滴	全開	●														●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	9	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	10	5－FU	2400 mg/㎡	持続注入用ポンプ	46時間	●	●	●												●	●	●											
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	11	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート				●														●											
内服	1	半夏瀉心湯	7.5 g	1日3回食間/食前		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	ウルソ	300 mg	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	3	プリンペラン	15 mg	1日3回食前		●	●	●												●	●	●											
内服	4	重曹	3 g	1日3回食間		●	●	●												●	●	●											
内服	5	酸化マグネシウム/マグラックス	1.2-1.8 g	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	6	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●													●	●											
放射線			Gy																														

特記事項

76歳以上：1段階減量を考慮（FOLFIRI）。
※UGT1A1遺伝子多型にてホモ接合体、複合ヘテロ接合体をもつ場合は、1段階以上の減量を行う（最大50%まで減量を考慮）。

減量規定

薬品名	ベクティビックス	トポテシン※	レボホリナート	5－FU(急速)	5－FU(持続)
標準投与量	6 mg/kg	150 mg/㎡	200 mg/㎡	400 mg/㎡	2400 mg/㎡
1段階減量	4.8 mg/kg	120 mg/㎡	減量なし	300 mg/㎡	2000 mg/㎡
2段階減量	3.6 mg/kg	100 mg/㎡		200 mg/㎡	1600 mg/㎡
3段階減量	中止				