(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　mFOLFOX6　療法　1サイクル 2 週

☐ 結腸がんにおける術後化学療法(6ヶ月)

疾患名　☐ 進行再発大腸がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1							2							3							4						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ	●														●													
注射	2	グラニセトロン デキサート	3 mg 6.6 mg	点滴	30分	●														●													
注射	3	エルプラット 5%糖液	85 mg/㎡ 250 ml	点滴	2時間	●														●													
注射	4	レボホリナート 生理食塩液	200 mg/㎡ 200 ml	点滴(側管)	2時間	●														●													
注射	5	5-FU 生理食塩液	400 mg/㎡ 50 ml	点滴	全開	●														●													
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	7	5-FU 生理食塩液	2400 mg/㎡ 100 ml	持続注入用ポンプ 全量100mlに調製	46時間	●	●	●												●	●	●											
注射	8	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート				●														●											
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●													●	●											
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

エルプラット投与量が600mg/㎡を超えた場合、エルプラットは担当医の判断で適宜休止して次のサイクルを開始することができる。

減量規定

薬品名	エルプラット	レボホリナート	5-FU(急速)	5-FU(持続)	
標準投与量	85 mg/㎡	200 mg/㎡	400 mg/㎡	2400 mg/㎡	
1段階減量	65 mg/㎡	減量なし	300 mg/㎡	2000 mg/㎡	
2段階減量	50 mg/㎡		200 mg/㎡	1600 mg/㎡	
3段階減量					