(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　mFOLFOX6+アービタックス　療法　1サイクル 2 週

疾患名　治癒切除不能の進行・再発結腸・直腸がん

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ	●							●							●							●						
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																											
		デキサート	6.6 mg			●														●													
注射	3	デキサート	6.6 mg	点滴	30分																											
		生理食塩液	100 ml										●														●						
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	5	アービタックス≪初回≫	400 mg/㎡	点滴	2時間																											
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																												
		アービタックス≪2回目以降≫	250 mg/㎡	点滴	1時間	●							●							●							●						
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製																												
注射	6	生理食塩液	100 ml	点滴	1時間																											
					2回目以降																												
					30分可	●							●							●							●						
注射	7	エルプラット	85 mg/㎡	点滴	2時間																											
		5%糖液	250 ml			●														●													
注射	8	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴(側管)	2時間																											
		生理食塩液	200 ml			●														●													
注射	9	5-FU	400 mg/㎡	点滴	全開																											
		生理食塩液	50 ml			●														●													
注射	10	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																											
						●														●													
注射	11	5-FU	2400 mg/㎡	持続注入用ポンプ	46時間																											
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製		●	●	●												●	●	●											
注射	12	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート				●					●									●					●						
内服	1	レスタミン	50 mg	アービタックス投与30-60分前		●							●							●							●						
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●													●	●											
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
放射線			Gy																													

特記事項

MECであるが、悪心強い方にはアプレピタントの投与を考慮。
※詳細は添付文書参照

減量規定

薬品名	アービタックス※	エルプラット	レボホリナート	5-FU(急速)	5-FU(持続)
標準投与量	250 mg/㎡	85 mg/㎡	200 mg/㎡	400 mg/㎡	2400 mg/㎡
1段階減量	200 mg/㎡	65 mg/㎡	減量なし	300 mg/㎡	2000 mg/㎡
2段階減量	150 mg/㎡	50 mg/㎡		200 mg/㎡	1600 mg/㎡
3段階減量	中止				