(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　mFOLFOX6+ベクティビックス　療法　1サイクル 2 週

疾患名　KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ	●														●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	4	ベクティビックス	6 mg/kg	点滴	1時間	●														●													
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	6	エルプラット	85 mg/㎡	点滴	2時間	●														●													
		5%糖液	250 ml																														
注射	7	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●														●													
		生理食塩液	200 ml																														
注射	8	5-FU	400 mg/㎡	点滴	全開	●														●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	9	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	10	5-FU	2400 mg/㎡	持続注入用ポンプ	46時間	●	●	●												●	●	●											
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	11	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート				●														●											
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●													●	●											
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
放射線			Gy																														

特記事項

エルプラット投与量が600mg/㎡を超えた場合、エルプラットは担当医の判断で適宜休止して次のサイクルを開始することができる。

減量規定

薬品名	ベクティビックス	エルプラット	レボホリナート	5-FU(急速)	5-FU(持続)
標準投与量	6 mg/kg	85 mg/㎡	200 mg/㎡	400 mg/㎡	2400 mg/㎡
1段階減量	4.8 mg/kg	65 mg/㎡	減量なし	300 mg/㎡	2000 mg/㎡
2段階減量	3.6 mg/kg	50 mg/㎡		200 mg/㎡	1600 mg/㎡
3段階減量	中止				