__療法___1サイクル___2__週

_{疾患名} 治癒切除不能な進行·再発大腸癌(12サイクル)

大窓口																														
注射		商品名	用量(/回)	投与ルート							2						3					4								
内服R			用量(/日) 用法		1	2 3	3 4	5	6 7	7 8	9	10	11 12	13	14 1	5 1	6 17	18	19 2	20 2	1 22	23	24 2	25 26	27	28				
放射線		照射部位	照射量	0.40.10													4					4		Н	4	Ш				
		生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ																									
注射	1					•	,																							
别																														
		KLID		F >±	20./\	₩.	Ш.										4				-	4	\vdash	Н	4	\square	_			
注射		グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																									
	2	デキサート	9.9 mg			•										•														
别						-																								
		トポテシン	165 mg/m ²	点滴	90分						-						+	┢			_	╇	 	H	+	+	\dashv			
注射		生理食塩液	250 ml		907]	•																								
	3	工柱及塩水	230 1111													•														
ניג						-																								
		エルプラット	85 mg/m ²	点滴	2時間		\vdash			+	+		\dashv				+	+	Н	\vdash	+	+	۲	\forall	+	\forall	\dashv			
注射		5%糖液	250 ml	抓加	스바닷티																									
	4	♥ / VIIII/IA	200 1111																											
21	-																													
注射	7	レボホリナート	200 mg/m²	点滴(側管)	2時間				H			H	\dashv			1	t	T	H		t	+	T	\vdash		Ħ	\dashv			
		生理食塩液	200 ml	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	311.3	•																								
	5																													
注射		生理食塩液	50 ml	点滴	15分												T							П	Т	\Box	\exists			
	Ì																													
	6																													
		5-FU	3200 mg/m ²	持続注入用ポンプ	48時間																	T		П		\square	T			
注		生理食塩液	200 ml	全量200mlに調製			_																							
注射	′																•		1											
		ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート																										
注射	8						_																							
射	۱						•												1											
																							l							
注射	9																													
射	Ĭ																													
注	10																													
射																														
	_			11															Ш			4		\sqcup	4	Ш	_			
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-		_							4									4	Ľ	\sqcup	4	Ш	_			
	- 1	イメンド	80 mg	1日1回朝			•											•				4		\sqcup	4		_			
		デカドロン	8 mg	1日1回朝			•							•				•				Ļ			1	إ	_			
		半夏瀉心湯	7.5 g	1日3回食間			•				•		•			•	,		_	•		<u> </u>					•			
		ウルソ	300 mg	1日3回倉			•			-	-	H	\dashv								+	+	H	\vdash	+	H	\dashv			
		プリンペラン 重曹	15 mg	1日3回倉			•						\dashv								+	+		\vdash	+	H	\dashv			
		<u>里胃</u> 酸化マグネシウム	3 g	1日3回負 1日3回負			0						\dashv									+		\vdash	+	\vdash	\dashv			
	9	皮 山 マノ ヤン ノム	1.2-1.8 g	「口3凹ま	とな					-	+		\dashv						+			+	\vdash	\dashv	+	H	\dashv			
内服							+	-		-	+		\dashv				+	+	H			+	\vdash	\dashv	+	H	\dashv			
放射線	10		Gy				+				+		\dashv				+		Н		+	+	\vdash	\vdash	+	H	\dashv			
以利称			Gy		特記事項																			ш			\dashv			
減量	其	準は別紙参照			1111077																						ᅱ			
へ手		一・ベルルタが、							_ ,	- - -	_ ,																			

※UGT1A1遺伝子多型にてホモ接合体、複合ヘテロ接合体をもつ場合は、1段階以上の減量を行う(最大50%まで減量を考慮)。

薬品名											
標準投与量											
1段階減量											
2段階減量											
3段階減量											