(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　XELIRI　療法　1サイクル 3 週

疾患名　治癒切除不能な進行･再発の結腸･直腸がん

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	トポテシン	※200 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		生理食塩液	500 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
内服	1	ゼローダ※※	1600 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	3	半夏瀉心湯	7.5 g	1日3回食間/食前		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
内服	4	ウルソ	300 mg	1日3回食後		●	●	●																									
内服	5	プリンペラン	15 mg	1日3回食前		●	●	●																									
内服	6	重曹	3 g	1日3回食間		●	●	●																									
内服	7	酸化マグネシウム	1.2-1.8 g	1日3回食後		●	●	●																									
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																

特記事項

※UGT1A1遺伝子多型にてホモ接合体、複合ヘテロ接合体をもつ場合は、150mg/㎡で開始する。
※※ゼローダは1日目の夕食後より服用開始。

ゼローダ減量基準	1日投与量		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.26㎡未満	1800mg/日	1200mg/日	1200mg/日
1.26㎡以上1.31㎡未満			
1.31㎡以上1.69㎡未満	2400mg/日	1800mg/日	
1.69㎡以上1.76㎡未満	3000mg/日		
1.76㎡以上1.88㎡未満		2400mg/日	
1.88㎡以上2.07㎡未満			1800mg/日
2.07㎡以上2.26㎡未満	3600mg/日		
2.26㎡以上		3000mg/日	

減量規定

薬品名	トポテシン	ゼローダ			
標準投与量	200(150) mg/㎡	上記参照			
1段階減量	150(125) mg/㎡				
2段階減量	125(100) mg/㎡				
3段階減量		中止(CCr≦30)			