(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　GS(ゲムシタビン+S-1)　療法　1サイクル 3 週

疾患名　☐ 膵がん　☐ 胆道がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●							●																				
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分	●							●																				
		生理食塩液	100 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●																				
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	TS-1	60 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

胆道癌でも広義の膵癌に準じて適応する場合あり
グラニセトロンは適宜使用

減量規定

薬品名	ゲムシタビン	TS-1(1.25㎡未満)	TS-1(1.25㎡以上1.50㎡未満)	TS-1(1.50㎡以上)	
標準投与量	1000 mg/㎡	60 mg/day	80 mg/day	100 mg/day	
1段階減量	800 mg/㎡		60 mg/day	80 mg/day	
2段階減量	600 mg/㎡			60 mg/day	
3段階減量					