(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ゲムシタビン+アブラキサン　療法　1サイクル 4 週

疾患名　治癒切除不能な膵がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●							●							●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●													
注射	3	アブラキサン	125 mg/㎡	点滴	30分	●							●							●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●													
注射	5	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分	●							●							●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●													
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●						●	●						●	●											
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

・アブラキサンでは過敏症予防のための前投薬は必須ではないが、必要に応じてステロイド剤や抗ヒスタミン剤の前投薬を検討する。
・溶解後の懸濁液は生理食塩液等で希釈しないこと。
・血漿分画製剤に係わる同意説明文書の取得が必要となる。

減量規定

薬品名	アブラキサン	ゲムシタビン			
標準投与量	125 mg/㎡	1000 mg/㎡			
1段階減量	100 mg/㎡	800 mg/㎡			
2段階減量	75 mg/㎡	600 mg/㎡			
3段階減量					