(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ゲムシタビン+シスプラチン+S-1　療法　1サイクル 2 週

疾患名　治癒切除不能な胆道がん(12サイクル)

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●														●													
注射	2	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●														●													
注射	3	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	9.9 mg																														
注射	4	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分	●														●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	6	シスプラチン	25 mg/㎡	点滴	1時間	●														●													
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製																													
注射	7	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●														●													
注射	8	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●														●													
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	S-1	※80 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●							
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	(●)												●	●	(●)										
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

減量規定

薬品名	ゲムシタビン	TS-1(1.25㎡未満)	TS-1(1.25㎡以上1.50㎡未満)	TS-1(1.50㎡以上)	
標準投与量	1000 mg/㎡	80mg/day	100mg/day	120mg/day	
1段階減量	800 mg/㎡	60mg/day	80mg/day	100mg/day	
2段階減量	600 mg/㎡				
3段階減量	上記以降、20%ずつ減量				