(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　オニバイド+5FU/LV　療法　1サイクル 2 週

疾患名　がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ	●														●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	4	オニバイド	70 mg/㎡	点滴	90分	●														●													
		生理食塩液	500 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	6	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴	2時間	●														●													
		生理食塩液	200 ml																														
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	8	5-FU	2400 mg/㎡	持続注入用ポンプ	46時間	●	●	●												●	●	●											
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	9	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート				●														●											
注射	10																																
内服	1	半夏瀉心湯	7.5 g	1日3回食間/食前		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	ウルソ	300 mg	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	3	メトクロプラミド	15 mg	1日3回食前		●	●	●												●	●	●											
内服	4	重曹	3 g	1日3回食間		●	●	●												●	●	●											
内服	5	酸化マグネシウム	1.2-1.8 g	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	6	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●													●	●											
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※UGT1A1遺伝子多型にてホモ接合体、ヘテロ接合体をもつ場合は、50mg/m^{2}を開始用量とする。 忍容性が認められる際は1回70mg/m^{2}に増量可能。

減量規定

薬品名	オニバイド	※オニバイド	5-FU(持続)		
標準投与量	70 mg/㎡	50 mg/㎡	2400 mg/㎡		
1段階減量	50 mg/㎡	43 mg/㎡	1800 mg/㎡		
2段階減量	43 mg/㎡	35 mg/㎡	1350 mg/㎡		
3段階減量	中止	中止	中止		