(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ネダプラチン+5-FU+RT（前治療）　療法　1サイクル 5 週

疾患名　食道がん（2サイクル）

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	アクプラ	90 mg/㎡	点滴	1時間30分	●																											
		生理食塩液	500 ml																														
注射	3	デキサート	6.6 mg	点滴(側管)	30分		●	●	●	●																							
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	5-FU	800 mg/㎡	点滴	24時間	●	●	●	●	●																							
		生理食塩液	500 ml																														
注射	5	ソリューゲンF	500 ml	点滴(側管)	2時間30分	●																											
注射	6	ソリューゲンF	500 ml	点滴(側管)	2時間30分	●																											
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分						●																						
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線				月～金曜日		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

特記事項

・Day1：尿量1000mL/12時間以下の場合、フロセミド10mgを静注する
・Day2～5：尿量750mL/12時間以下の場合、フロセミド10mgを静注する
・後治療を追加する場合は、前治療2サイクル目の開始日より28日以上のインターバルで開始してもよい

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					