(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　FP(800/80)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　食道がん術後(2サイクル)

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	フィジオゾール3号	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	2	フィジオ140	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	3	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	13.2 mg																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	シスプラチン	80 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																													
注射	5	デキサート	6.6 mg	点滴(側管)	30分		●	●	●	●																							
		生理食塩液	100 ml																														
注射	6	フィジオゾール3号	500 ml	点滴(側管)	2時間		●	●	●	●																							
注射	7	5-FU	800 mg/㎡	点滴	24時間	●	●	●	●	●																							
		生理食塩液	500 ml																														
注射	8	フロセミド	10 mg	静注(側管)		●																											
注射	9	フィジオゾール3号	500 ml	点滴(側管)	2時間	●																											
注射	10	フィジオ140	500 ml	点滴(側管)	2時間	●																											
注射	11	生理食塩液	50 ml	点滴	15分						●																						
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
放射線																																	

特記事項

Day1：尿量1000mL/12時間以下の場合、フロセミド10mgを静注する
Day2～5：尿量750mL/12時間以下の場合、フロセミド10mgを静注する
Day1の前日：1500mL前後の補液を追加する(食事量によって)

減量規定

なし(2サイクル目：投与基準に達していない場合は中止となる)