(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　A＋CHP　療法　1サイクル 3 週

疾患名　未治療のCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫（最大8サイクル）

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●																										
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●																										
注射	3	ドキソルビシン	50 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●																										
		生理食塩液	100 ml																													
注射	4	エンドキサン	750 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●																										
		生理食塩液	500 ml																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	10分	●																										
注射	6	アドセトリス	1.8 mg/kg	点滴(側管)	30分	●																										
		注射用水	5mg/mlで溶解																													
		生理食塩液	※0.4-1.2mg/mlで希釈																													
			※最大180mg																													
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	プレドニゾロン	100 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●	●	●																						
内服	2																															
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

※アドセトリスが50mg以下の場合は生理食塩液50mlで、50-150mgの場合は生理食塩液100mlで、150mg以上の場合は250mlで希釈する。
アドセトリス：CCr30未満で減量を考慮

減量規定

薬品名	アドセトリス				
標準投与量	1.8 mg/kg				
1段階減量	1.2 mg/kg				
2段階減量	中止				
3段階減量					