

治療計画書

療法名

ACR+ETP

療法

1サイクル 週

(ID 0) ☆7

疾患名 急性骨髄性白血病(難反応例)

| 注射 内服 放射線 | Rp | 商品名 | 用量(/回) | 投与ルート | 投与時間 | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 用量(/日) | | | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | |
| | | 照射部位 | 照射量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 1 | 生理食塩液 | 500 ml | 点滴 | キープ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 2 | グラニセトン | 3 mg | 点滴(側管) | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 3 | アクラシノン | 60 mg/m ² | 点滴(側管) | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 4 | ラステット | 100 mg/m ² | 点滴(側管) | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 500 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 5 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴(側管) | ルートフラッシュ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線 | | | Gy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項

減量規定

| 薬品名 | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 標準投与量 | | | | |
| 1段階減量 | | | | |
| 2段階減量 | | | | |
| 3段階減量 | | | | |