(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　VcR-CAP(静注)療法　療法　1サイクル 3 週

疾患名　マントル細胞リンパ腫(6～8コース)

		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間
注射	Rp		用量(/日)	用法	
放射線		照射部位	照射量		
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ
注射	2	生理食塩液	100 ml	点滴	キープ
注射	3	リツキシマブ	375 mg/㎡	点滴(側管)	フローシートに従う
		生理食塩液	ml	10倍希釈	
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ
注射	5	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分
注射	6	ドキソルビシン	50 mg/㎡	点滴(側管)	30分
		生理食塩液	100 ml		
注射	7	エンドキサン	750 mg/㎡	点滴(側管)	2時間
		生理食塩液	500 ml		
注射	8	ベルケイド	1.3 mg/㎡	静注(側管)	
		生理食塩液	1mg/mlで溶解		
注射	9				
注射	10				
内服	1	ネオマレルミンTR	6 mg	リツキシマブ投与30分前	
内服	2	ブルフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前	
内服	3	プレドニゾロン	100 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後	
内服	4	ナウゼリン	30 mg	1日3回	
内服	5				
内服	6				
内服	7				
内服	8				
内服	9				
内服	10				
放射線			Gy		



特記事項

減量規定

薬品名	ベルケイド				
標準投与量	1.3 mg/㎡				
1段階減量	1 mg/㎡				
2段階減量	0.7 mg/㎡				
3段階減量	中止				