(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　シスプラチン+RT　　療法　1サイクル 3 週

疾患名　頭頸部がん(3サイクル)

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	2	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	3	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	シスプラチン	100 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																													
注射	5	フロセミド	10 mg	静注(側管)		●																											
注射	6	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	7	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	2	イメンド	80 mg	1日1回朝食後			●	●																									
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●	◉																							
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			70 Gy	2Gy/day		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●									

特記事項

減量規定

薬品名	シスプラチン				
標準投与量	60≦CCr	100 mg/㎡			
1段階減量	45≦CCr＜60	75 mg/㎡			
2段階減量	30≦CCr＜45	50 mg/㎡			
3段階減量	CCr＜30	中止			