(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　イリノテカン　療法　1サイクル 4 週

疾患名　乳がん

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 用量(/回) / 用量(/日) / 照射部位	照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●							●							●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●							●							●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	トポテシン	100 mg/㎡	点滴	2時間	●							●							●													
		生理食塩液	500 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●													
注射	5	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●							●							●													
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	半夏瀉心湯※	7.5 g	1日3回食間/食前		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	ウルソ	300 mg	1日3回食後		●	●	●					●	●	●					●	●	●											
内服	3	プリンペラン	15 mg	1日3回食前		●	●	●					●	●	●					●	●	●											
内服	4	重曹	3 g	1日3回食間		●	●	●					●	●	●					●	●	●											
内服	5	酸化マグネシウム/マグラックス	1.2～1.8 g	1日3回食後		●	●	●					●	●	●					●	●	●											
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
放射線			Gy																														

特記事項

①適応条件：PS0～1で主要臓器機能に大きな異常がないこと　②慎重投与：PS2以上、75歳以上の高齢者、糖尿病の患者、肝機能・腎機能障害のある患者

Day8、Day15のイリノテカンは、次のいずれか1つでも満たす場合は中止する。①白血球数＜3000/m㎥②血小板数＜10万/m㎥③G3以上の下痢

※第1コース開始3日前より服用開始。本法継続中は連用。

減量規定

薬品名	トポテシン				
標準投与量	100 mg/㎡				
1段階減量	80 mg/㎡				
2段階減量	中止				
3段階減量					