(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名 トラスツズマブ(1週毎)+パクリタキセル(1週毎)　療法　1サイクル 1 週

疾患名　乳がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●							●							●							●						
注射	2	ファモチジン	20 mg	点滴	30分	●							●							●							●						
		デキサート	9.9 mg																														
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	4	トラスツズマブ≪初回≫	4 mg/kg	点滴	1時間30分	●							●							●							●						
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
		トラスツズマブ≪2回目以降≫	2 mg/kg	点滴	※30分可																												
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	6	パクリタキセル	80 mg/㎡	点滴	1時間	●							●							●							●						
		生理食塩液	250 ml																														
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	8	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●							●							●							●						
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	パクリタキセルの30分前まで		●							●							●							●						
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					