(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　パージェタ+トラスツズマブ（3週毎）+ドセタキセル　療法　1サイクル　3　週

疾患名　HER2陽性の手術不能又は再発乳がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●																											
注射	2	パージェタ≪初回≫	840 mg	点滴	1時間	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
		パージェタ≪2回目以降≫	420 mg	点滴	※30分可																												
		生理食塩液	250 ml																														
注射	3	生理食塩液	100 ml	点滴	※1時間	●																											
注射	4	トラスツズマブ≪初回≫	8 mg/kg	点滴	1時間30分	●																											
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
		トラスツズマブ≪2回目以降≫	6 mg/kg	点滴	※30分可																												
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	6	ファモチジン	20 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
		生理食塩液	50 ml																														
注射	7	ドセタキセル	75 mg/㎡	点滴	1時間	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	9	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●																											
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	ドセタキセルの30分前まで		●																											
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮可。

減量規定

薬品名	ドセタキセル				
標準投与量	75 mg/㎡				
1段階減量	55 mg/㎡				
2段階減量					
3段階減量					