

治療計画書

療法名 パーージェタ+トラスツズマブ(3週毎)+ビノレルビン

療法 1サイクル 3 週

疾患名 HER2陽性の手術不能又は再発乳がん

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																											
						照射部位	照射量	用法																									
注射		生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ																												
注射	1																																
注射	2	パーージェタ<<初回>>	840 mg	点滴	1時間																												
		生理食塩液	250 ml																														
注射	3	パーージェタ<<2回目以降>>	420 mg	点滴	※30分可																												
		生理食塩液	250 ml																														
注射	4	トラスツズマブ<<初回>>	8 mg/kg	点滴	1時間30分																												
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
注射	5	トラスツズマブ<<2回目以降>>	6 mg/kg	点滴	※30分可																												
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
注射	6	生理食塩液	100 ml	点滴	※1時間																												
注射	7	ナベルピン	25 mg/m ²	点滴	10分																												
		生理食塩液	50 ml																														
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
注射	9	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート																													
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
末梢から投与する場合は、静脈炎予防のためナベルピン投与後に生理食塩液200mlを投与する。

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量